



Желаем вам здоровья!



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**АМИ** российское агентство  
медицинско-социальной  
информации  
Российское агентство медико-социальной информации АМИ  
для Министерства здравоохранения Российской Федерации



Если у вас  
повышен  
**холестерин**



Материал разработан  
**ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины»**  
Минздрава России

## Если у вас повышен холестерин


**Холестерин является жизненно необходимым веществом в организме человека.** Холестерин вместе с другими липидами и белками входит в состав мембран клеток. Кроме того, холестерин является материалом для образования в организме человека важных биологически активных соединений: в печени он служит предшественником желчных кислот, в эндокринных органах холестерин участвует в синтезе стероидных гормонов: тестостерона, эстрадиола, прогестерона, кортизола, альдостерона. Продукт его окисления под влиянием ультрафиолетовых лучей превращается в кожу в витамин D<sub>3</sub>.

Уровень холестерина в крови определяется соотношением процессов его поступления с пищей и всасывания в кишечнике, синтеза, в основном, в печени, и выделения из организма. Когда холестерина в организме, прежде всего, в крови, становится слишком много, он откладывается в стенках кровеносных сосудов, способствуя развитию атеросклеротических бляшек, которые сужают и закупоривают просвет сосудов.


Если закупорка происходит в сосудах, снабжающих кровью сердце, развивается стенокардия и/или инфаркт миокарда, если в сосудах мозга — мозговой инсульт. Иногда поражаются сосуды ног — в таком случае человек испытывает невыносимые боли и часто теряет способность передвигаться. **Один из звонков, сигнализирующих о высоком риске развития перечисленных заболеваний, — повышенный уровень холестерина в крови.**

### Атеросклероз

Нормальная артерия



Артерия с атеросклеротической бляшкой



Нормальный кровоток

Сниженный кровоток

## Что означают цифры в анализе крови, который вы получаете?

**Каждый человек старше 20 лет должен знать свой уровень холестерина.** Для этого нужно не реже одного раза в 5 лет делать анализ крови для определения уровня общего холестерина и его содержания в различных липопroteинах — белково-липидных комплексах, осуществляющих транспорт холестерина в кровотоке. Это холестерин, входящий в состав липопroteинов очень низкой плотности, транспортирующих, в основном, триглицериды (**холестерин ЛПОНП**); в состав наиболее опасных атерогенных липопroteинов низкой плотности, которые еще называют **«плохой» холестерин (холестерин ЛПНП)**; и липопroteинов высокой плотности (**холестерин ЛПВП**), защищающих артерии от отложения холестерина (так называемый **«хороший» холестерин**).

### Что делать, если уровень холестерина в вашей крови повышен?

Содержание холестерина можно снизить. Любые профилактические мероприятия включают в себя немедикаментозные и медикаментозные вмешательства. Немедикаментозные вмешательства — это **отказ от курения, увеличение физической активности, снижение избыточного веса и здоровая антиатерогенная диета**.

### Основные принципы антиатерогенной диеты

**1) Снижение потребления жира** (не более 30% калорийности питания), при этом насыщенный (твёрдый, животный) жир должен составлять не более 1/3 всего потребляемого жира, остальные 2/3 — ненасыщенные (жикие) жиры: растительные масла (подсолнечное, соевое, кукурузное, оливковое, рапсовое), рыбий жир, мягкие маргарины (спреды, изготовленные по новой технологии без гидрогенизации растительных жиров, содержащие не более 2% пространственно измененных транс-форм жирных кислот).

**2) Потребление холестерина не более 300 мг в сутки.** Ограничением потребления с пищей продуктов, содержащих много животных жиров и холестерина, заменой их растительными жирами, низкожировыми продуктами, рыбой, зерновыми продуктами, овощами и фруктами можно снизить уровень холестерина в крови на 10–12%.



**3) Потребление углеводов должно составлять 50–60% общей калорийности**, в основном за счет сложных углеводов зерновых, овощей, фруктов, содержащих 30–40 г клетчатки, в том числе водорастворимой. Количество простых углеводов (сахара) должно составлять не более 30–60 г в сутки.

**4) Ежедневное потребление овощей и фруктов должно составлять не менее 500 г.**

### Что делать, если диета не дала результатов?

Если через 6–8 недель диеты снижение уровня общего холестерина в крови не достигло целевого — менее 5 ммоль/л, и уровня холестерина ЛПНП меньше 3 ммоль/л, то врач может назначить вам лекарства, снижающие уровень холестерина в крови. Назначенное врачом медикаментозное лечение длится долго и требует постоянного лабораторного контроля за уровнем всех форм липопroteинов, транспортирующих холестерин, и возможными нежелательными явлениями, чтобы их вовремя предупредить.

**В заключение следует отметить, что, согласно результатам многочисленных международных профилактических программ, коррекция нарушений системы транспорта холестерина продлевает здоровую жизнь человека.**